

# Material Teórico - Módulo Introdução à Probabilidade

## Ferramentas básicas

### Segundo Ano do Ensino Médio

**Autor: Prof. Fabrício Siqueira Benevides**  
**Revisor: Prof. Antonio Caminha M. Neto**



# 1 Solução do Problema dos Pontos

Conforme prometido no material da aula anterior, começaremos apresentando uma solução para o problema dos pontos. Começemos com o seguinte caso particular, que já havíamos enunciado.

**Problema 1** (Problema dos pontos). *Em um jogo entre duas equipes, o total de apostas é de 16 ducados (uma moeda antiga). Ganha esse valor a equipe que primeiro obtiver 6 pontos em uma série de partidas, cada uma das quais valendo um ponto. O jogo precisou ser interrompido em certo momento, quando a equipe A estava com 5 pontos e a equipe B com 3 pontos. Considerando-se que, ainda assim, em cada partida seguinte as duas equipes teriam chances iguais de vencer, como se deve dividir (de forma justa) as moedas entre as duas equipes?*

**Solução 1.** Devemos dividir as moedas entre as duas equipes de modo que cada uma receba um valor proporcional à probabilidade que ela possui de vencer o jogo, ou seja, completar os 6 pontos.

Veja que  $A$  precisa de apenas um ponto para vencer, enquanto  $B$  precisa de 3 pontos. Observe ainda que, caso elas continuassem jogando, após no máximo 3 novas partidas uma das equipes conseguiria o número de pontos necessários para vencer. A fim de obter um espaço equiprovável, vamos considerar todos os possíveis resultados dessas três partidas, conforme a tabela abaixo.

Partida 1	Partida 2	Partida 3
A	A	A
A	A	B
A	B	A
A	B	B
B	A	A
B	A	B
B	B	A
B	B	B

Como em cada partida os jogadores têm chances iguais de ganhar (cada um tem probabilidade  $1/2$  de ganhar cada partida), temos que esses 8 resultados são, de fato, equiprováveis. Assim, cada um deles ocorre com probabilidade  $1/8$ . Por fim, observe que dentre essas 8 possibilidades, há 7 que são favoráveis ao jogador  $A$  e apenas uma que é favorável ao jogador  $B$  (a última linha da tabela é a única em que  $B$  consegue ganhar 3 pontos antes que  $A$  consiga ganhar um ponto). Logo, a probabilidade de  $A$  vencer o jogo é igual  $7/8$ .

Agora, como  $\frac{7}{8} \cdot 16 = 14$ , concluímos que 14 das 16 moedas devem ser dadas ao jogador  $A$  e 2 devem ser dadas ao jogador  $B$ .  $\square$

**Solução 2.** Observe que, na realidade, é possível encerrar o jogo no momento em que um dos jogadores atinge a

pontuação necessária para vencer. Sendo assim, em vários dos casos listados na tabela anterior, não há necessidade de observarmos os resultados das partidas 2 ou 3 para determinarmos o vencedor. De fato, na prática há apenas 4 possíveis situações:

- (a)  $A$  vence a Partida 1. Neste caso,  $A$  vence o jogo independentemente do resultado das outras partidas.
- (b)  $B$  vence a Partida 1 e  $A$  vence Partida 2. Daí,  $A$  vence o jogo independentemente do resultado da Partida 3.
- (c)  $B$  vence as Partidas 1 e 2, e  $A$  vence a Partida 3. Daí,  $A$  vence o jogo.
- (d)  $B$  vence as Partidas 1, 2 e 3. Neste caso,  $B$  vence o jogo.

Dentre essas 4 situações,  $A$  vence em 3 deles e  $B$  vence em uma. Por conta disso, o leitor poderia achar, erroneamente, que a probabilidade de  $A$  vencer é igual a  $3/4$ . Mas é preciso ter bastante atenção: essas quatro possíveis situações não são equiprováveis. De fato, a situação (a) ocorre com probabilidade  $1/2$  (uma vez que ela depende apenas do resultado da primeira partida); a situação (b) acontece com probabilidade  $1/4$  (pois há 4 possíveis resultados para as duas primeiras partidas dentre os quais estamos considerando apenas um deles); e as situações (c) e (d) acontecem (cada uma) com probabilidade  $1/8$ . Neste caso, a probabilidade de  $A$  ganhar pode ser calculada somando-se as probabilidades correspondentes aos itens (a), (b) e (c):

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{7}{8}.$$

$\square$

Vamos, agora, resolver uma versão mais geral do problema anterior, para cuja solução adaptamos a primeira solução apresentada à versão anterior.

**Problema 2.** *Um jogo entre duas equipes é disputado em várias partidas, cada uma valendo um ponto. Ganha a equipe que primeiro conseguir acumular um total de  $T$  pontos. O jogo precisou ser interrompido em um momento onde a equipe  $A$  estava com  $p$  pontos e a equipe  $B$  com  $q$  pontos. Porém, considera-se que em cada partida seguinte as duas equipes teriam chances iguais de vencer. Qual a probabilidade da equipe  $A$  vencer o jogo?*

**Solução.** Sejam  $m = T - p$  e  $n = T - q$ , e observe que a equipe  $A$  precisa de mais  $m$  pontos para ganhar, enquanto  $B$  precisa de  $n$  pontos.

Observe agora que o vencedor fica determinado após o resultado das próximas  $m + n - 1$  partidas. De fato, se após essa quantidade de partidas ainda não houvesse um vencedor, então  $A$  teria ganho no máximo  $m - 1$  pontos e  $B$  teria ganho no máximo  $n - 1$  pontos, de modo que

no máximo  $(m - 1) + (n - 1) = m + n - 2$  pontos teriam sido distribuídos. Mas esse não é o caso, uma vez que as  $m + n - 1$  partidas jogadas teria distribuído  $m + n - 1$  pontos.

Então, vamos considerar como espaço amostral o conjunto de todos os  $2^{m+n-1}$  possíveis resultados para essa sequência de  $m + n - 1$  novas partidas. Como em cada partida  $A$  e  $B$  têm a mesma chance de ganhar, esses  $2^{m+n-1}$  resultados são equiprováveis. Resta, pois, calcular o número de casos favoráveis, ou seja, calcular em quantas dessas sequências de partidas o jogador  $A$  vence o jogo.

Dada um sequência em particular de resultados para as  $m + n - 1$  partidas, seja  $x$  o número de partidas que  $A$  ganhou. Para que  $A$  vença o jogo como um todo, é necessário que  $x \geq m$ . Por outro lado, como o total de partidas é  $m + n - 1$  sempre que  $x \geq m$ , o número de pontos que  $B$  irá conquistar será no máximo  $m + n - 1 - x \leq n - 1$ , de forma que  $B$  não terá ganho o jogo ainda. Dito de outra maneira, independentemente da ordem em que  $A$  ganhar  $x \geq m$  pontos nas  $m + n - 1$  partidas restantes,  $A$  irá vencer o jogo. Isto posto, é imediato que há exatamente  $\binom{m+n-1}{x}$  maneiras de  $A$  ganhar o jogo fazendo exatamente  $x$  pontos, onde  $x \geq m$ . Variando-se o valor de  $x$  de  $m$  a  $m + n - 1$ , obtém-se que o total de maneiras em que  $A$  pode vencer é igual a:

$$\binom{m+n-1}{m} + \binom{m+n-1}{m+1} + \dots + \binom{m+n-1}{m+n-1}. \quad (1)$$

Portanto, a probabilidade de  $A$  vencer o jogo é:

$$\Pr('A \text{ vencer}') = \frac{\binom{m+n-1}{m} + \binom{m+n-1}{m+1} + \dots + \binom{m+n-1}{m+n-1}}{2^{m+n-1}}.$$

Por fim, é claro que substituindo os valores de  $m$  e  $n$ , por  $T - p$  e  $T - q$ , respectivamente, também podemos obter uma resposta em função de  $T$ ,  $p$  e  $q$ .  $\square$

**Observação 3.** Usando o fato que  $\binom{m+n-1}{m+i} = \binom{m+n-1}{n-1-i}$ , também podemos escrever a soma (??) como:

$$\binom{m+n-1}{0} + \dots + \binom{m+n-1}{n-2} + \binom{m+n-1}{n-1}.$$

Assim,

$$\Pr('A \text{ vencer}') = \frac{\binom{m+n-1}{0} + \dots + \binom{m+n-1}{n-2} + \binom{m+n-1}{n-1}}{2^{m+n-1}}.$$

## 2 Terminologia e fatos básicos

Descrevemos aqui o vocabulário típico usado em Teoria das Probabilidades. Suponha que temos um espaço amostral  $\Omega$ , de onde iremos sortear um elemento de acordo com uma dada função de probabilidade  $\Pr$ . A função  $\Pr$  é comumente chamada de *distribuição*. Vimos no material anterior que um *evento*  $A$  de  $\Omega$  nada mais é do que um subconjunto de  $\Omega$ . A probabilidade do *evento*  $A$  acontecer,

denotada  $\Pr(A)$ , corresponde à probabilidade do elemento sorteado pertencer ao conjunto  $A$ . Vimos também que, quando o espaço amostral  $\Omega$  é finito,  $\Pr(A)$  é igual à soma das probabilidades dos elementos de  $A$ .

Dizemos que dois eventos  $A$  e  $B$  de  $\Omega$  são *igualmente prováveis* quando ambos possuem a mesma probabilidade (de acontecer), ou seja, quando  $\Pr(A) = \Pr(B)$ . O *evento impossível* corresponde ao conjunto vazio e, portanto, possui probabilidade 0 (zero). O *evento certo* corresponde ao conjunto  $\Omega$  e, portanto, possui probabilidade 1 (um).

Dizemos que dois eventos  $A$  e  $B$  são *mutuamente exclusivos*, ou *disjuntos*, quando  $A \cap B = \emptyset$ . Isso equivale a dizer que os eventos  $A$  e  $B$  não podem acontecer simultaneamente (já que o elemento sorteado não pode pertencer a  $A$  e  $B$  ao mesmo tempo). Assim, se tivermos a informação de que um deles acontece, podemos excluir a possibilidade do outro também acontecer. Conforme havíamos observado no material anterior, a seguinte afirmação é imediata:

**União de dois eventos disjuntos:** se  $A$  e  $B$  são eventos mutuamente exclusivos, então

$$\Pr(A \cup B) = \Pr(A) + \Pr(B).$$

A propriedade acima pode ser generalizada facilmente (com a mesma demonstração) para o caso de termos  $k$  eventos  $A_1, \dots, A_k$ , os quais sejam (*dois a dois*) *mutuamente exclusivos*, isto é, sejam tais que a interseção entre dois quaisquer deles seja vazia. Mais precisamente, também temos a seguinte propriedade:

**União de eventos dois a dois disjuntos:** se  $A_1, \dots, A_k$  são eventos (dois a dois) mutuamente exclusivos, então

$$\Pr(A_1 \cup \dots \cup A_k) = \Pr(A_1) + \dots + \Pr(A_k).$$

Dois eventos são *complementares* quando são mutuamente exclusivos e sua união é igual ao espaço amostral  $\Omega$ . O (único) evento complementar a  $A$  é o evento  $A^c = \Omega - A$ , que é formado pelos elementos de  $\Omega$  que não estão em  $A$ . (Em alguns livros são encontradas outras notações para o complementar, tais como  $\bar{A}$  ou  $A^c$ .) Veja que  $\Pr(A^c)$  representa a probabilidade de  $A$  não acontecer. Assim:

**Probabilidade do complementar:** se  $A^c$  é o evento complementar a  $A$ , então

$$\Pr(A^c) = 1 - \Pr(A).$$

O fato acima pode ser demonstrado formalmente da seguinte maneira: inicialmente, observe que  $A \cap A^c = \emptyset$ , ou seja,  $A$  e  $A^c$  são mutuamente exclusivos. Portanto,

$$\Pr(A \cup A^c) = \Pr(A) + \Pr(A^c).$$

Por outro lado,  $A \cup A^c = \Omega$ , o evento certo. Assim,  $\Pr(A \cup A^c) = \Pr(\Omega) = 1$ , de sorte que

$$\Pr(A) + \Pr(A^c) = 1$$

ou, ainda,  $\Pr(A^c) = 1 - \Pr(A)$ .

De forma semelhante ao que estudamos nas aulas sobre princípios básicos de contagem, em muitos problemas é mais fácil calcular a probabilidade de um evento não acontecer do que calcular diretamente a probabilidade de que ele aconteça. Vejamos um exemplo nesse sentido.

**Exemplo 4.** De um grupo de 10 pessoas, formado por 6 homens e 4 mulheres, serão sorteadas 5 pessoas. Qual a probabilidade de se sortear pelo menos uma mulher.

**Solução.** Seja  $A$  o evento “sortear pelo menos uma mulher”. No lugar de tentar calcular a probabilidade de  $A$  diretamente, vamos calcular a probabilidade de seu complementar,  $A^c$ , que equivale a “não sortear mulher alguma”. (Formalmente, nosso espaço amostral  $\Omega$  é o conjunto de todos os subconjuntos de 5 pessoas escolhidas dentre as 10, e  $A$  é o subconjunto de  $\Omega$  formado por aqueles conjuntos de 5 pessoas que possuem pelo menos uma mulher).

O total de maneiras (casos possíveis) de sortear as 5 pessoas dentre as 10 é  $\binom{10}{5}$ . O número de maneiras de escolher as 5 pessoas de forma que não haja mulher alguma é  $\binom{6}{5}$  (já que as 5 pessoas teriam de ser escolhidas dentre os 6 homens). Logo  $\Pr(A^c) = \frac{\binom{6}{5}}{\binom{10}{5}} = \frac{1}{42}$ . Daí, o que queremos é

$$\Pr(A) = 1 - \Pr(A^c) = 1 - \frac{1}{42} = \frac{41}{42}.$$

□

### 3 União de dois eventos quaisquer

No caso em que os eventos não são disjuntos, a probabilidade de sua união pode ser calculada usando o seguinte resultado.

**Proposição 5.** Sejam  $A$  e  $B$  dois eventos quaisquer de um mesmo espaço amostral. Vale que

$$\Pr(A \cup B) = \Pr(A) + \Pr(B) - \Pr(A \cap B).$$

**Demonstração.** A ideia é que, ao somarmos  $\Pr(A)$  com  $\Pr(B)$ , estamos somando as probabilidades de todos os elementos de  $A \cup B$ , mas as probabilidades dos elementos de  $A \cap B$  estão sendo somadas duas vezes (pois tais elementos estão tanto em  $A$  como em  $B$ ); por isso, devemos subtrair  $\Pr(A \cap B)$ . Para obter um prova formal, iremos particionar  $A \cup B$  e usar os fatos da seção anterior.

Veja que  $A \cup B = (A - B) \cup (A \cap B) \cup (B - A)$  e que os conjuntos  $(A - B)$ ,  $(A \cap B)$  e  $(B - A)$  são dois a dois disjuntos (veja a Figura ??). Sendo assim, temos:

$$\Pr(A \cup B) = \Pr(A - B) + \Pr(A \cap B) + \Pr(B - A).$$




Figura 1: Interseção e diferenças entre conjuntos  $A$  e  $B$ .

Por outro lado, veja que podemos escrever:

$$A = (A - B) \cup (A \cap B),$$

com os conjuntos  $A - B$  e  $A \cap B$  também disjuntos. Logo,

$$\Pr(A) = \Pr(A - B) + \Pr(A \cap B) \quad (2)$$

e, de forma análoga,

$$\Pr(B) = \Pr(B - A) + \Pr(A \cap B). \quad (3)$$

Somando as relações (2) e (3), obtemos:

$$\begin{aligned} \Pr(A) + \Pr(B) &= \Pr(A - B) + \Pr(A \cap B) \\ &\quad + \Pr(B - A) + \Pr(A \cap B). \end{aligned}$$

Reordenando os termos da igualdade acima, temos que:

$$\begin{aligned} \Pr(A - B) + \Pr(A \cap B) + \Pr(B - A) &= \\ &= \Pr(A) + \Pr(B) - \Pr(A \cap B). \end{aligned}$$

Por fim, como vimos no início, o lado esquerdo da expressão acima é igual a  $\Pr(A \cup B)$ . Logo

$$\Pr(A \cup B) = \Pr(A) + \Pr(B) - \Pr(A \cap B),$$

como queríamos demonstrar. □

**Exemplo 6.** Um dado honesto com seis faces (numeradas de 1 a 6) é lançado. Vejamos duas maneiras de calcular a probabilidade do evento “obter um número ímpar ou um primo”.

O espaço amostral é  $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ . O conjunto dos números ímpares de  $\Omega$  é  $A = \{1, 3, 5\}$ , e o dos números primos é  $B = \{2, 3, 5\}$ . Os elementos de  $\Omega$  que são ímpares e primos ao mesmo tempo são os elementos de  $A \cap B = \{3, 5\}$ ; por outro lado, os que são ímpares ou primos são os que estão em  $A \cup B = \{1, 2, 3, 5\}$ .

Podemos calcular diretamente

$$\Pr(A \cup B) = \frac{|A \cup B|}{|\Omega|} = \frac{4}{6}.$$

Por outro lado, podemos ver também que  $\Pr(A) = 3/6$ ,  $\Pr(B) = 3/6$  e  $\Pr(A \cap B) = 2/6$ . Sendo assim, pela fórmula para a probabilidade da união, temos

$$\begin{aligned} \Pr(A \cup B) &= \Pr(A) + \Pr(B) - \Pr(A \cap B) \\ &= \frac{3}{6} + \frac{3}{6} - \frac{2}{6} = \frac{4}{6}. \end{aligned}$$

A maioria dos eventos cuja descrição envolve o conectivo “OU” corresponde à união de dois eventos.

**Exemplo 7.** Escolhendo-se ao acaso um número inteiro de 26 a 175, qual a probabilidade de ser escolhido um número que:

- (a) é múltiplo de 4?
- (b) é múltiplo de 6?
- (c) é múltiplo de 4 e de 6?
- (d) é múltiplo de 4 ou de 6?
- (e) não é múltiplo de 12.

**Solução.** Temos  $\Omega = \{26, 27, \dots, 175\}$ , de sorte que  $|\Omega| = 175 - 26 + 1 = 150$ .

- (a) O menor e o maior múltiplos de 4 em  $\Omega$  são respectivamente  $4 \cdot 7 = 28$  e  $4 \cdot 43 = 172$ . Logo, a quantidade de múltiplos de 4 no intervalo dado é  $43 - 7 + 1 = 37$ . A probabilidade desejada é, portanto, igual a  $37/150$ .
- (b) De forma análoga, há 25 múltiplos de 6 em  $\Omega$  (o menor é  $6 \cdot 5$  e o maior é  $6 \cdot 29$ ). Logo, a probabilidade desejada é  $25/150$ .
- (c) Todo inteiro que é múltiplo de 6 e de 4 é múltiplo de  $\text{mmc}(4, 6) = 12$ . Como nos itens anteriores, podemos verificar que a quantidade de múltiplos de 12 em  $\Omega$  é igual a 12. Logo, a resposta é  $12/150$ .
- (d) Podemos aplicar a Proposição ??, juntamente com o que calculamos nos itens anteriores, para obter a probabilidade desejada:

$$\frac{37}{150} + \frac{25}{150} - \frac{12}{150} = \frac{50}{150} = \frac{1}{3}.$$

- (e) Como a probabilidade de se obter um múltiplo de 12 é igual a  $\frac{12}{150}$ , a probabilidade de não se obter isso é igual a

$$1 - \frac{12}{150} = \frac{138}{150}.$$

□

**Observação 8.** A fórmula para o cálculo da probabilidade da união de três eventos quaisquer é dada por:

$$\begin{aligned} \Pr(A \cup B \cup C) &= \Pr(A) + \Pr(B) + \Pr(C) \\ &\quad - \Pr(A \cap B) - \Pr(A \cap C) - \Pr(B \cap C) \\ &\quad + \Pr(A \cap B \cap C). \end{aligned}$$

Uma generalização disto para qualquer quantidade finita de eventos pode ser obtida através do chamado Princípio da Inclusão-Exclusão. Recomendamos a referência 1. da seção “Sugestões de Leitura Complementar” para o leitor que deseja aprender mais sobre isso.

**Exemplo 9 (Paradoxo do Aniversário).** Em um grupo de 23 pessoas escolhidas aleatoriamente, a probabilidade de que duas delas façam aniversário no mesmo dia é maior do que 50%. Se o grupo tiver 57 pessoas ou mais, tal probabilidade é maior do que 99%. Entretanto, a probabilidade só é igual a 100% se tivermos pelo menos 367 pessoas.

**Demonstração.** Apesar de que o enunciado acima não é um paradoxo propriamente dito, ele é comumente chamado de paradoxo por ser contra-intuitivo. Para simplificar o cálculo, vamos considerar que o ano não é bissexto e que as pessoas têm a mesma probabilidade de nascer em qualquer dia do ano (desconsiderando eventuais sazonalidades).

Assuma que temos um grupo de  $n$  pessoas. Se  $n \leq 366$ , então, pelo Princípio da Casa dos Pombos, existem duas pessoas que fazem aniversário no mesmo dia (Considerando que o ano pudesse ser bissexto, precisaríamos de 367 pessoas). Suponha, agora, que  $n \leq 365$ . Considere as seqüências formadas pelos dias do ano do aniversário de cada uma das  $n$  pessoas (digamos, ordenadas de acordo com a ordem alfabética dos nomes das pessoas). O total de seqüências é igual a  $365^n$ . A quantidade delas em que todas fazem aniversário em dias distintos é igual a:

$$365 \cdot (365 - 1) \cdot \dots \cdot (365 - n + 1) = \frac{365!}{(365 - n)!}.$$

Logo, a probabilidade desejada é igual a

$$p_n = 1 - \frac{365!}{365^n (365 - n)!}.$$

É possível calcular esse valor facilmente para  $n = 1$  ou  $n = 2$ , mas não há uma maneira elementar de calculá-lo valores grandes de  $n$ . Entretanto, com o auxílio de um computador é possível obter a seguinte tabela para os valores aproximados de  $p_n$ :

$n$	$p_n$
10	12,0%
20	41,0%
23	50,7%
30	70,0%
50	97,0%
100	99,99996%
350	$(1 - 3 \cdot 10^{-131})100\%$
367	100%

□

## 4 O problema de Mére

Vejamos primeiro dois problemas mais simples.

**Problema 10.** *Um dado honesto com seis faces é lançado 3 vezes. Qual a probabilidade de se obter pelo menos um número igual a seis. E se jogarmos o dados 6 vezes?*

**Solução.** Se observarmos o resultado dos três lançamentos, temos um total de  $6^3 = 216$  resultados possíveis. Vamos calcular a probabilidade do evento complementar ao que foi pedido. A quantidade de resultados dos três lançamentos em que o número seis não aparece nenhuma vez é igual a  $5^3 = 125$ . Sendo assim, a probabilidade de não obter um seis é igual a  $\frac{125}{216} = 0,58$ . Então, a probabilidade de obter pelo menos um seis é igual a  $1 - 0,58 = 0,42$ .

Com o mesmo argumento, se jogarmos o dado seis vezes, concluímos que a probabilidade de obter pelo menos um seis é igual a

$$1 - \left(\frac{5}{6}\right)^6 = 1 - \frac{15625}{46656} \simeq 1 - 0,33 = 0,67.$$

□

É interessante observar que, ao lançarmos o dado uma única vez, a probabilidade do resultado ser igual a seis é  $1/6$ . Contudo, ao lançá-lo três vezes, a probabilidade de que o primeiro, o segundo ou o terceiro resultado seja igual a seis não é igual a  $\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = 0,50$ , pois estes três eventos não são disjuntos. Do mesmo modo, a probabilidade de obter ao menos um seis ao lançá-lo seis vezes ainda está longe de  $6/6 = 100\%$ . Mas vale o fato de que, quanto mais vezes lançarmos o dado, maior será a probabilidade de se obter ao menos um seis.

**Problema 11.** *Ao lançarmos um par de dados honestos, qual a probabilidade da soma dos valores obtidos ser igual a 7.*

**Solução.** Aqui, o nosso espaço amostral  $\Omega$  é o conjunto de todos os pares ordenados  $(a, b)$  onde  $a, b \in \{1, \dots, 6\}$ . Assim  $|\Omega| = 6 \cdot 6 = 36$ . Dentre esses, os pares  $(1, 6)$ ,  $(2, 5)$ ,  $(3, 4)$ ,  $(4, 3)$ ,  $(5, 2)$  e  $(6, 1)$  são aqueles em que a soma dos valores é igual a 7. Logo, há 6 casos favoráveis e a probabilidade desejada é igual a  $6/36 = 1/6$ . □

**Observação 12.** *No problema anterior, mesmo que os dados sejam idênticos devemos usar como espaço amostral um conjunto de pares ordenados, pois do contrário o espaço amostral não resultaria equiprovável. Por exemplo, o evento de obter os números 1 e 2 nos dados tem o dobro de chances de acontecer do que o evento de obter o número 1 em ambos os dados.*

Em 1654, Chevalier de Mére, um nobre Francês interessado em jogos de azar e apostas, chamou a atenção de Pascal e Fermat para o que ele achava ser uma contradição ao tentar resolver o problema seguinte.

**Problema 13.** *Ao lançar um par de dados 24 vezes, deve-se apostar se iremos obter simultaneamente o número seis em ambos os dados em ao menos uma das vezes. É mais provável que isso aconteça ou que não aconteça?*

A pergunta acima deu início a uma série de trocas de cartas entre Pascal e Fermat. Os cálculos de Mére indicavam que ele deveria apostar que o par seis não iria acontecer. Porém, na prática, ao jogar várias vezes, Mére constatou que era melhor apostar na ocorrência do par. A seguir, exibimos uma solução para esse problema.

**Solução.** Ao lançar o par de dados um única vez temos  $6 \cdot 6 = 36$  possíveis resultados, dos quais apenas um é favorável. Ao lançar o par 24 vezes, se anotarmos a sequência de resultados, o número total de possíveis sequências é  $36^{24}$ . O conjunto dessas sequências é nosso espaço amostral equiprovável. Queremos contar o número de sequências em que o par  $(6, 6)$  aparece, mas é mais fácil contar o número de vezes em que ele não aparece. Neste caso, em cada um dos lançamentos temos 35 possibilidades ruins, o que nos dá um total de  $35^{24}$  sequências em que o  $(6, 6)$  não aparece.

Logo, a probabilidade não obter o par  $(6, 6)$  é igual a  $\left(\frac{35}{36}\right)^{24}$ . Com o auxílio de uma calculadora científica, é possível checar que esse valor é aproximadamente 0,508, que é maior do que 50%. Portanto, há mais chances de não obter o par  $(6, 6)$  do que de obtê-lo. □

## 5 Exercícios resolvidos

Nesta seção, colecionamos alguns problemas resolvidos, a fim de exercitar um pouco mais a teoria.

**Problema 14 (UERJ).** *Com o intuito de separar o lixo para reciclagem, uma instituição colocou em suas dependências cinco lixeiras de diferentes cores, de acordo com o tipo de resíduo a que se destina: vidro, plástico, papel, metal e lixo orgânico. Sem olhar para as lixeiras, João joga em uma delas uma garrafa plástica e em outra uma garrafa de vidro. A probabilidade de que ele tenha usado corretamente pelo menos uma lixeira é igual a:*

- (a) 25%.    |    (b) 30%.    |    (c) 35%.    |    (d) 40%.

**Solução 1.** Como as garrafas foram lançadas em lixeiras distintas, o número total maneiras de lançá-las é  $5 \cdot 4 = 20$ . O evento ‘usar corretamente pelo menos uma lixeira’ pode acontecer de três maneiras (disjuntas).

- (a) A garrafa de plástico cai na lixeira correta e a de vidro na errada: isso pode ocorrer de  $1 \cdot 3 = 3$  modos.  
(b) A garrafa de vidro cai na lixeira correta e a de plástico na errada: também há  $1 \cdot 3 = 3$  modos disso ocorrer.  
(c) Ambas as garrafas caem nas lixeiras corretas: há exatamente  $1 \cdot 1 = 1$  modo disso ocorrer.

Logo, há  $3 + 3 + 1 = 7$  casos favoráveis, de forma que a probabilidade pedida é igual a  $7/20$ .  $\square$

**Solução 2.** Considere o mesmo espaço amostral da solução anterior, e sejam  $A$  o evento “colocar a garrafa de plástico na lixeira correta” e  $B$  o evento “colocar a garrafa de vidro na lixeira correta”. Veja que  $\Pr(A) = 1/5$  e  $\Pr(B) = 1/5$ . Também, como há apenas uma maneira colocar ambas as garrafas na lixeira correta, temos  $\Pr(A \cap B) = 1/20$ . Assim, a probabilidade desejada é igual a:

$$\begin{aligned}\Pr(A \cup B) &= \Pr(A) + \Pr(B) - \Pr(A \cap B) \\ &= \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{20} = \frac{7}{20}.\end{aligned}$$

$\square$

**Problema 15** (Enem, adaptada). *Um apostador tem três opções para participar de certa modalidade de jogo, que consiste no sorteio aleatório de um número, dentre dez possíveis. Opção 1: comprar três números para um único sorteio. Opção 2: comprar dois números para um dado sorteio e um número para outro sorteio. Opção 3: comprar um número para cada sorteio, num total de três sorteios. Se  $X$ ,  $Y$  e  $Z$  representam as probabilidades de o apostador ganhar pelo menos um prêmio escolhendo, respectivamente, a Opção 1, a Opção 2 e a Opção 3, é correto afirmar que:*

- (a)  $X < Y < Z$ .
- (b)  $X = Y = Z$ .
- (c)  $X > Y = Z$ .
- (d)  $X = Y > Z$ .
- (e)  $X > Y > Z$ .

**Solução.** Claramente, temos que  $X = \frac{3}{10} = 30\%$ . Para calcularmos  $Y$  e  $Z$ , usamos o cálculo da probabilidade do evento complementar. Na Opção 2, serão realizados dois sorteios, num total de 100 resultados possíveis. Destes,  $8 \cdot 9 = 72$  são ruins (esse é o total de casos correspondente a não ganharmos no primeiro nem no segundo sorteio). Logo  $Y = 1 - \frac{8}{10} \cdot \frac{9}{10} = 28\%$ . De forma análoga (veja também a solução do Problema ??), temos que  $Z = 1 - \left(\frac{9}{10}\right)^3 = 1 - \frac{729}{1000} = 27,1\%$ .

Portanto,  $X > Y > Z$ , de sorte que a alternativa correta é o item (??).  $\square$

A solução do problema anterior nos mostra que, para ganharmos pelo menos um prêmio, é melhor concentrarmos as apostas em um único sorteio. Na verdade, isso não é uma surpresa: considere o caso em que o apostador pode escolher 10 números. Se ele escolher todos os números em um único sorteio, é garantido que irá ganhar. Por outro lado, se ele escolher um único número em dez sorteios distintos,

pode acontecer que ele não ganhe. Entretanto, é importante observar que, concentrando as apostas, o apostador poderá ganhar no máximo um prêmio, enquanto apostando em jogos diferentes existe uma (pequena) chance de que ele ganhe mais de um prêmio.

**Problema 16** (UERJ). *Um pessoa mistura as 28 peças de um dominó e retira a peça (5, 3) do jogo. Em seguida, ela retira outra peça ao acaso, sem repor a primeira. Calcule a probabilidade da segunda peça possuir um 2 ou um 4.*

**Solução.** Após retirar a primeira peça, sobram 27 peças. Sendo assim, nosso espaço amostral contém 27 elementos. Dentre eles, há 7 peças que possuem o número 2 (lembre-se de que a primeira peça que foi removida não possui o 2). Logo, a probabilidade de que a segunda peça contenha o 2 é igual a  $7/27$ . Do mesmo modo, a probabilidade de que a segunda peça contenha o número 4 é igual a  $7/27$ . Por outro lado, pode acontecer de que a segunda peça sorteada contenha tanto o 2 como o 4. Isso acontece apenas se ela for a peça (2, 4), logo, ocorre com probabilidade  $1/27$ .

Usando a expressão para a probabilidade da união, temos que a probabilidade desejada é igual a:

$$\frac{7}{27} + \frac{7}{27} - \frac{1}{27} = \frac{13}{27}.$$

$\square$

## Dicas para o Professor

Observe que, nas soluções dos problemas aqui expostos, evitamos usar o fato de que alguns dos eventos analisados são independentes, já que esse assunto será abordado apenas na aula seguinte. Do mesmo modo, evitamos usar o conceito de probabilidade condicional. Assim, algumas vezes poderíamos ter simplificado o cálculo de certas probabilidades pedidas multiplicando outras tantas probabilidades mais simples. Entretanto, para tornar a exposição mais elementar (e condizente com o material das vídeo-aulas), preferimos sempre calcular o número de total de casos favoráveis (com o auxílio do princípio fundamental de contagem) e dividir pelo total de casos possíveis.

## Sugestões de Leitura Complementar

1. P. C. P. Carvalho, P. Fernandez, A. C. de O. Morgado, J. B. Pitombeira. *Análise Combinatória e Probabilidade*. SBM, Rio de Janeiro, 2000.
2. J. P. O. Santos, M. P. Mello e I. T. Murari. *Introdução à Análise Combinatória*. Rio de Janeiro, Ciência Moderna, 2007.